

膵がん・胆道がん・肝細胞がん

公開日	レジメン名	抗癌剤(一般名)	用量	用法	1コース	適応
2020/4/1	GEM(1000)	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1,8,15	28日	膵癌/胆道癌
2020/4/1	GEM+S1	ゲムシタピン テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム(S1)	1000mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /日	点滴静注 day1,8 経口投与 day1-14	21日	胆道癌
2020/4/1	GC	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1,8 点滴静注 day1,8	21日	胆道癌
2020/4/1	GCS	ゲムシタピン シスプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム(S1)	1000mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 経口投与 day1-7	14日	胆道癌
2020/4/1	GEM(1000)+nab-PTX(125)	アルブミン懸濁型パクリタキセル ゲムシタピン	125mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1,8,15 点滴静注 day1,8,15	28日	膵癌
2020/4/1	GEM+エルロチニブ	ゲムシタピン エルロチニブ	1000mg 100mg/body/日	点滴静注 day1,8,15 経口投与 連日	28日	膵癌
2020/4/1	FOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナートカルシウム イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 180mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 bolus day1 46時間持続	14日	膵癌
2022/3/1	modified FOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナートカルシウム イリノテカン フルオロウラシル	85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 46時間持続	14日	膵癌
2022/3/1	nal-IRI+FL	リポソーム化イリノテカン レボホリナートカルシウム フルオロウラシル	70mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1 点滴静注 day1 46時間持続	14日	膵癌
2020/4/1	ラムシルマブ(8)	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 day1	14日	肝細胞癌